

伝染病一覧表 ★は登園許可書必要

鶴見あけぼの保育園

病名	潜伏期間	症状		原因	登園停止期間	留意点
★麻疹	約10日	熱 くしゃみ 鼻水 せき ほおの内側に斑点	首筋から赤い斑点のようは発疹 顔、胸、手足と全身に広がる	麻疹ウイルス 空気感染	医師の指示	肺炎、脳炎、中耳炎 合併症に注意
★風疹 (三日はしか)	2～3 週間	発熱 はしかよりやや小さい ピンクの発疹	顔、首、全身に発疹 耳の後ろの リンパ腺がはれる	せき、くしゃみ 飛沫感染	医師の指示	風疹抗体のない 1～3ヶ月の妊婦は注意
★水痘 (水ぼうそう)	2～3 週間	微熱と同時に顔、口の中 胸、背中、手足、頭皮に発疹	赤い斑点 水疱は破れてかさぶた かゆみもでる	空気感染 水ぶくれのリンパ液	医師の指示	かゆみがあるので 爪を短く切る
★おたふくかぜ	2～3 週間	発熱 耳の下に腫れ 耳が痛い 食べると痛い	片側だけ腫れる場合もある 熱がない場合もある	飛沫感染	医師の指示	髄膜炎、脾臓炎 に注意
★百日咳	1～2 週間	くしゃみ 鼻水 咳	息ができないほど激しく咳き込む ヒューという音(レプリーゼ)	せき、くしゃみ 飛沫感染	医師の指示	肺炎、中耳炎に注意 特に乳児は重症になる
★突発性発疹症	10日前後	高熱が続く	熱さがると腹部を中心に発疹 生後半年～1年の乳児に多い	飛沫感染	医師の指示	
★インフルエンザ	1～3日	高熱 のどの痛み 咳 関節痛	感染力が高い	飛沫 咳 つば くしゃみ	医師の指示	中耳炎、気管支炎、肺炎 脳炎など起こす場合もある
とびひ		皮膚に水ぶくれ 破れて 赤くむけた状態	虫刺されや湿疹をかきむしる 広がっていく	膿疱が破れ皮膚に とびひする	患部が湿った状 態ならプール×	
★流行性結膜炎 (はやり目)	4～5日	まぶたの腫れ 異物感 痛み 充血	目やにがついて目が開けられな かったり発熱を伴う場合もある	タオルの共有 手指の接触	医師の指示	角膜炎を起こし視力の低下 もある
★咽頭結膜炎 (プール熱)	4～5日	高熱 のどの痛み 目のかゆ 痛み 充血	腹痛 下痢 鼻水 リンパ節の腫れ	せき、くしゃみ飛沫 プールの水を介して 感染することもある	医師の指示	冬での流行することがある
★手足口病	2～4日	発熱 てのひら 足の裏水疱	口の中にできて痛い	飛沫感染	医師の指示	食欲不振になるので消化 の良いものを与える
りんご病	1～2週間	発熱はあまりない 顔、両ほほに発疹	紅斑は蝶々のようは形 口のまわりはでない	不明		
★溶連菌感染症		高熱 のどの腫れ おう吐 頭痛	首のリンパが腫れる 全身に小さ い発疹 舌に白いコケ状のもの 赤くブツブツしてくる	くしゃみ 唾液 飛沫感染	医師の指示	
流行性おう吐 下痢症 (ロタウイルス)	1～3日	激しいおう吐 下痢	便が白っぽくなる 高熱 食欲不振	経口感染 飛沫感染	医師の指示	生後半年～2歳の子が多い 脱水症状にならないように